

## ヒブ感染症の予防接種の接種方法

対象者	接種開始時期	初回接種	追加接種
生後 2 月 から生後 60 月 に 至るまで	生後 2 月から 生後 7 月に至 るまでの間	生後 12 月に至るまでの間に 27 日 以上（医師が必要と認める場合は 20 日以上）の間隔をおいて 3 回接 種。（標準的には 27 日から 56 日 までの間隔） ただし、2 回目、3 回目は生後 12 月に至るまでに行い、超えた場合 は接種しない（追加接種は可）。	初回接種終了後 7 月以上（標準的には 7 月から 13 月）の間隔をおいて 1 回接 種。 ただし、3 回の初回接種が完了せずに、 生後 12 月以降に追加接種を行う場合 は、初回接種終了後 27 日（医師が必要 と認めるときは 20 日）以上の間隔をお いて 1 回接種。
	生後 7 月から 生後 12 月に 至るまでの 間	生後 12 月に至るまでの間に 27 日 以上（医師が認める場合は 20 日以 上）の間隔をおいて 2 回接種。（標 準的には 27 日から 56 日までの間 隔） ただし、2 回目は生後 12 月に至る までに行い、超えた場合は接種し ない（追加接種は可）。	初回接種終了後 7 月以上（標準的には 7 月から 13 月）の間隔をおいて 1 回接 種。 ただし、初回接種が完了せずに、生後 12 月以降に追加接種を行う場合は、初 回接種終了後 27 日（医師が必要と認め るときは 20 日）以上の間隔をおいて 1 回接種。
	生後 12 月に 至った日の 翌日から生 後 60 月に至 るまでの間	1 回接種	なし